



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Αθήνα 17.2.2011

Αριθμ.Πρωτ.380


Προς τους
 Πρόεδρους των Ιατρικών Συλλόγων
 Της Χώρας


Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων, με αριθμ.πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.7345/11.1.2011 με θέμα: "Εμβολιασμός με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)", με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος

 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Ο Γεν.Γραμματέας

 Δρ. Κώστας Ι. Αλεξανδρόπουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
 PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
 www.pis.gr • e-mails: KENTRIKO: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr. pisinter1@pis.gr
 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπαγιαννοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βερανζέρου 50
Ταχ. Κώδικας: 10438
Τηλέφωνο: 210 5239689
Fax: 210 5233563

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 11 -1 -2011
Αρ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ. 7345

ΠΡΟΣ:

1. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και τους Δήμους αρμοδιότητάς τους
2. Υ.Π.Ε. της χώρας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα Νοσοκομεία, Κ.Υ., Ι.Α.Κ. και Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας αρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ: «Εμβολιασμός με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)»

Σχετ.: 1. Τα Πρακτικά της 1^{ης} Συνεδρίασης για το 2010 (12/10/2010) της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

2. Η υπ' αριθ. 5 απόφαση της 226^{ης} /12-7-2010 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

3. Η με αρ. πρωτ. Υ1/ΓΠ 158238/23-1-2008 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, με θέμα «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών».

4. Το με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 82690/31-7-2009 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών: Εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου – Συστάσεις για τις δόσεις των βασικών εμβολιασμών».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Εμβολιασμός με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο

Ο εμβολιασμός με το νέο 13-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο συστήνεται να αρχίζει στην ηλικία των 2 μηνών. Αρχικά χορηγούνται 3 δόσεις εμβολίου με μεσοδιάστημα 1-2 μηνών και μία 4^η επαναληπτική δόση σε ηλικία 12-24 μηνών. Σε παιδιά 7-11 μηνών, που καθυστέρησαν να εμβολιασθούν, συνιστώνται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και μία 3^η επαναληπτική δόση σε ηλικία 12-24 μηνών. Επίσης σε παιδιά μεγαλύτερα των 12 μηνών που πρωτοεμβολιάζονται, συνιστώνται 2 δόσεις 13-δύναμου αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 2 μηνών. Σε παιδιά μεγαλύτερα των δύο ετών συνιστάται μόνο μία δόση εμβολίου (δοσολογία ίδια με τα παλαιότερα αντιπνευμονιοκοκκικά εμβόλια).

ΑΔΑ: 4Α9ΜΘ-Ψ

Σημειώνεται ότι για την μεταβατική περίοδο ισχύουν τα εξής:

1. Παιδιά μικρότερα των 7 μηνών που ήδη έχουν εμβολιασθεί με μία δόση αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου συνεχίζουν με 13-δύναμο με 4 συνολικά δόσεις.
2. Παιδιά μικρότερα των 7 μηνών που ήδη έχουν εμβολιασθεί με δύο δόσεις αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου συνεχίζουν με μία δόση 13-δύναμου μέχρι την ηλικία των 12 μηνών και με δύο δόσεις σε ηλικία 12-23 μηνών.
3. Παιδιά 2-5 ετών που έχουν ήδη πλήρως εμβολιασθεί με 4 δόσεις αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολίου (7-δύναμου ή 10-δύναμου) θα πρέπει να εμβολιασθούν με μία επιπλέον 5^η δόση 13-δύναμου.


Σε παιδιά που εμβολιάζονται με το 10-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, σε περιπτώσεις αλλαγής του εμβολίου ακολουθείται το σχήμα όπως του 7-δύναμου.

B. Εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

Για περιπτώσεις ανοσοκαταστολής, ενδείκνυται ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και σε μεγαλύτερες των 26 ετών γυναίκες.

Επίσης, το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), δύναται να συνταγογραφηθεί σε κορίτσια ηλικίας από 12 έως και 18 ετών, από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Μαιευτικής- Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας. Για τις ηλικίες από 18 έως και 26 ετών, το εμβόλιο δύναται να συνταγογραφηθεί από ιατρούς ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**



A. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντωνία Παπαδοπούλου

1. Ε.Ο.Φ.
Μεσογείων 384, 11522 Χολαργός
2. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
3. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134, 118 54 Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
4. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)
Νίκητρά 8-10, 10678 Αθήνα

